

FICHE DE FABRICATION

Imprimé le : mer 1 jul 2009 à 17:26

Protocole : **HERCEPTIN**

N° ordonnancier : 3 636

Patient : FOURCADE Rose Claire	Poche N° 4
IPP : Sexe : Féminin	HERCEPTIN (trastuzumab) 130 mg 6,2 ml
N dossier : 122 N dossier papier	Vecteur CHLORURE DE SODIUM 0,9% 250 ml
Né(e) le : 10/02/1984 S (m2) : 1,73	Voie d'administration PERF Durée 00:30 mn à partir de T0 + 00:00
Taille 166 cm Poids 66 Kg clairance à la créatinine ml/mn	Conservation 00:00 h à l'abri de la lumière à l'abri de la lumière
Prescripteur AONCOLOG Pierre	Date et heure de péremption : 00/00/00 à 00:00
Administration prévue à J 8 mercredi 1 juillet 2009	
Cure N° 1 Ligne N° 1	

Reliquat	Spécialités pharmaceutiques	Dosage	Volume	Solvant Nature	Solvant Volume	Concentration	Volume à prélever	Dose à prélever	Lot Spécialité
4 135	HERCEPTIN 150MG PDR PERF FL 1	150 mg	ml	Eau PPI	7,2 ml	20,83 mg/ml	6,2 ml	130 ml	EEE45
Volume total de solution (reconstitué ou prêt emploi) à prélever								6,2	ml

Diluant **CHLORURE DE SODIUM 0,9% 250 ml**
Lot : **EEE45** Volume initial du vecteur en ml **250** à retirer **6,2** ml

Matériel	Dilution
	<ul style="list-style-type: none"> - Le volume approprié de solution doit être prélevé du flacon et introduit dans une poche à perfusion contenant 250 ml d'une solution de chlorure de sodium à 0,9%. - Ne pas utiliser de solution contenant du glucose car elles entraînent l'agrégation de la protéine. - La poche, doit être retournée doucement pour éviter la formation de mousse lors du mélange de la solution. Les solutions à usage parentéral doivent être contrôlées visuellement avant administration, à la recherche de particules ou d'un changement de coloration. - Une fois préparée, la perfusion doit être administrée immédiatement. Si la dilution a été effectuée de façon aseptique, la solution peut être conservée pendant 24 heures (à une température < + 30°C).
Reconstitution	<p>Chaque flacon de Herceptin doit être reconstitué avec 7,2 ml d'eau pour préparations injectables stérile. Toute reconstitution à l'aide d'autres solvants doit être évitée. Retourner le flacon doucement pour faciliter la reconstitution. Ne pas secouer ! La formation d'une petite quantité de mousse lors de la reconstitution peut survenir. Laisser le flacon au repos pendant environ 5 minutes. La solution de Herceptin reconstituée est transparente, incolore à jaune pâle, et ne doit pratiquement pas contenir de particules visibles.</p> <p style="text-align: right;">Volume final de la poche 250 ml Concentration finale du produit à administrer : 0,52 mg/ml</p>

	Date	heure début/fin :	Nom	Signature
Validation	01/07/2009	17:24	AONCOLOG Pierre	
Fabrication	01/07/2009	17:24 00:00	AONCOLOG Pierre	
Contrôle		00:00		
Libération		00:00		

Clinique Générale N°Ord : 3 636

Patient : **FOURCADE Rose Claire**
Service destinataire : **Chimio ambulatoire**
Spécialité : **HERCEPTIN (trastuzumab) 130 mg 6,2 ml**

Vecteur **CHLORURE DE SODIUM 0,9% 250 ml**Voie **PERF** Durée **00:30** Volume final en ml : **250 ml**Administration prévue à J **8** **mercredi 1 juillet 2009**

Fabrication : mer 1 jul 2009 à 17:24

Péremption **00/00/00** à **00:00**Conservation **à l'abri de la lumière à l'abri de la lumière**

Clinique Générale N°Ord : 3 636

Patient : **FOURCADE Rose Claire**
Service destinataire : **Chimio ambulatoire**
Spécialité : **HERCEPTIN (trastuzumab) 130 mg 6,2 ml**

Vecteur **CHLORURE DE SODIUM 0,9% 250 ml**Voie **PERF** Durée **00:30** Volume final en ml : **250 ml**Administration prévue à J **8** **mercredi 1 juillet 2009**

Fabrication : mer 1 jul 2009 à 17:24

Péremption **00/00/00** à **00:00**Conservation **à l'abri de la lumière à l'abri de la lumière**